

Nous avons dessiné, vu de dessus et de profil, l'avant-corps de l'Insecte, ainsi que celui d'une espèce voisine, le *R. quadraticeps* Ab. (fig. I-IV), et nous avons joint à cette note le relevé de quelques mensurations prises sur les *types* de l'une et l'autre de ces espèces.

NATURE DES MENSURATIONS.	R. QUADRATICEPS.	R. PARISIENSIS.
	millimètres.	millimètres.
Longueur du corps ⁽¹⁾	4 env.	4,3 env.
{ de l'insertion des antennes { au bord postérieur de la tête
Distance	0,49	0,56
{ du bord postérieur des yeux { au bord postérieur de la tête
Largeur de la tête en arrière des yeux	0,28	0,28
Épaisseur { près de la base	0,46	0,42
{ de la tête { au niveau des yeux	0,37	0,32
Largeur du lobe dorsale des yeux	8,53	0,46
Longueur du prothorax suivant la ligne médiane	0,18	0,14
Largeur du prothorax à la base	0,67	0,67
Longueur de l'écusson	1,24	1,06
Largeur de l'écusson au bord postérieur	0,18	0,28
Distance du bord postérieur de l'écusson au bord postérieur du métathorax	0,46	0,35
{ de l'élytre	0,81	0,71
Longueur { du cuilleron apical de l'élytre	1,76	1,80
{ du tibia intermédiaire	0,18	0,35
	0,95	0,85

LES ASTATHES (*COLÉOPTÈRES GÉRAMBYCIDÉS*) ET GENRES VOISINS,
DE LA COLLECTION DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. RENÉ OBERTHÜR.

L'ordre de classement suivi dans la liste ci-après est celui adopté par Gahan (in *Trans. Ent. Soc. Lond.*, 1901, p. 37). Les espèces marquées d'un astérisque sont celles dont les représentants ont été comparés aux types.

(1) La déformation que subit l'abdomen chez les individus desséchés ne permet pas de donner ici de mesures absolument exactes quant à la longueur totale du corps.

1. *ASTATHEA PERPLEXA* Newm. — Philippines (Laglaize, 1875); Manille (1861).
 2. *A. MINISZECHI** Thoms. — Philippines (Laglaize, 1875); Luçon (Marche, 1880); Manille (Barot, 1839, 1861).
 3. *A. GIBBICOLLIS** Thoms. — Moyen-Mékong : La Khon (D^r Harmand, 1878); Cambodge (D^r Harmand, 1875); Cochinchine (Miche de la Malleray, 1868; Pierre, 1878); Cochinchine, Monts de Chaudoc (D^r Harmand, 1877); Malacca (1863).
 4. *A. DIMIDIATA* Gory. — Java méridional (H. Fruhstorfer > Oberthür, 1902); Bornéo (R. Oberthür, 1902); Bornéo ou Sumatra (1873). Var? — Moyen-Mékong : La Khon (D^r Harmand, 1878); Cochinchine (Pierre, 1878); Cochinchine, Monts de Chaudoc (D^r Harmand, 1877); isthme de Kra (D^r Harmand, 1885).
- Contrairement à l'avis de M. Gahan, je considère ces derniers individus du continent comme spécifiquement distincts de ceux de l'archipel malais.
5. *A. BIMACULATA* Fabr. (*externa* Pasc. sec. Brit. Mus.). — Bombay (Fontanier, 1839).
 6. *A. VIOLACEIPENNIS** Thoms. (*ignita** Thoms.). — Sikkim (D^r Harmand, 1886); Bhoutan anglais; Maria Basti (R. Oberthür, 1902); Assam, monts Khasia (R. Oberthür, 1902).
 7. *A. JANTHINIPENNIS* Fairm*. — Tonkin (D^r Langue, 1885 et 1887).
 8. *A. EPISCOPALIS** Chevr. — Chine (Reiche, 1840; Parzudacki, 1852). Chang-Hai (Deyrolle, 1854). Se-Tchouen, Siào Lou (R. Oberthür, 1902). Kiang Si (Armand David > R. Oberthür, 1902). Kion-Kiang (Pratt > R. Oberthür, 1902).
 9. *A. CYANOPTERA** Gahan. Ille Hainan (Oberthür, 1902).
 10. *A. SPLENDIDA* Fabr. (*teste* Gahan). — Bornéo occidental, Pontianak (R. Oberthür, 1902).
 11. *A. LEMOIDES** Thoms. — Java (Reiche).
 12. *A. UNICOLOR* Pasc. — Bornéo (Chaper, 1891; R. Oberthür, 1902). Bornéo septentrional (R. Oberthür, 1902).
 13. *A. TERMINATA* Pasc. — Malacca (1863; de Morgan, 1892).
 14. *A. LEVIS* Newm. — Philippines, Luçon (Marche, 1880); Manille (1861).
 15. *A. VELATA** Thoms. — Java (Reiche, Toussaint, 1862; J.-D. Pasteur, 1894); Toëgoë (R. Oberthür, 1902); Soerabaja (de Waal, 1895).
 16. *A. RUFESCENS** Thoms. — Java (Toussaint, 1862); Gounod Gedeh (R. Oberthür, 1902).

17. *A. XITENS* Fabr. — Bornéo (Boncard, 1875). Malacca (1863; de Morgan, 1893).
18. *A. IGNORANTINA* Thoms. — Bornéo occidental, Pontianak (Oberthür, 1902). Malacca (de Morgan, 1892).
19. *A. BIPARTITA** Thoms. — Bornéo S.-E. (H.-W. Bates > R. Oberthür, 1902).
20. *A. CINCTA** Gahan. — Java (J.-D. Pasteur, 1894).
21. *A. PARTITA* Gahan. — Bornéo (Oberthür, 1902).
22. *A. FLAVIVENTRIS* Pasc. — Bornéo septentrional, Sandakan (Montano et Rey, 1880). Malacca (de Morgan, 1892). Ille Bengkalis, côte Est de Sumatra (Maindron, 1885).
23. *A. sp.* — Moyen-Mékong, La Khon (D^r Harmand, 1878).
24. *ANASTATHES NIGRICORNIS** Thoms. — Malacca (E. Deyrolle, 1882).
25. *A. BIPLAGIATA** Gahan. — Moyen-Mékong : Luang-Prabang (Counillon, 1896) et La Khon (D^r Harmand, 1878). Cambodge (D^r Harmand, 1875). — L'un des exemplaires est typique.
26. *CHREONOMA PALLIDIVENTRIS** Thoms. — Laos, Luang-Prabang à Theng (A. Pavie, 1888), La Khon (D^r Harmand, 1878); Cambodge (D^r Harmand, 1875); Battambang (A. Pavie, 1886). Cochinchine (Miche de la Malleray, 1868), Monts de Chaudoc (D^r Harmand, 1877).
27. *C. sp.* — Manille (1861).
28. *C. sp.* — Java ? (de la Savinière, 1879).
29. *C. COMATA** Gahan. — Chine (Gallay, 1846).
30. *CHREONOMA FORTUNEI** Thoms. — Chine septentrionale (Stevens, 1855). Id. var. *JAPONICA** Gahan. — Japon (R. Oberthür, 1902); province de Satsuma, Mukoda (R. Oberthür, 1902).
31. *LASIOPHYRS LATIFRONS** Gahan. — Bhoutan anglais, Maria Basti (R. Oberthür, 1902).
32. *PLAXOMICRUS VENTRALIS** Gahan. — Tonkin (D^r Langue, 1886).
33. *CYANASTUS AULICUS* Pasc. — Célèbes, Makassar (R. Oberthür, 1902).